



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДОРАСТОН

Торговое название препарата: Дорастон

Действующие вещества (МНН): метронидазол, клотримазол, хлоргексидина ацетат

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав:

1 суппозиторий содержит:

активные вещества: метронидазола – 200 мг; клотримазола – 160 мг; хлоргексидина ацетата – 8 мг;

вспомогательные вещества: полиэтилен глицероль 1500, полиэтилен глицероль 6000, титан диоксид, бутилированный гидрокситолуол.

Описание: суппозитории от белого до желтовато белого цвета, цилиндрической формы.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний. Производные имидазола.

Код АТХ: G01AF

Фармакологические свойства

Суппозитории Дорастон– это комбинированный препарат широкого антибактериального и противогрибкового действия.

Метронидазол обладает широким спектром действия в отношении простейших (трихомонады, лямблии), облигатных анаэробных бактерий (клостридии).

Клотримазол обладает широким спектром противогрибковой активности.

Хлоргексидин является одним из наиболее активных местных антисептических средств.

Фармакодинамика

Метронидазол, попадает в микроорганизм путем пассивной диффузии. Внутри бактериальной клетки он восстанавливается и биологически активный цитотоксичный метаболит поражает ДНК. Фермент, который восстанавливает нитрогруппу метронидазола, нитро-редуктаза, неэффективен в присутствии кислорода, этим объясняется то, что метронидазол действует только в анаэробных условиях.

Метронидазол эффективен при инфицировании некоторыми простейшими (*Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica* и *Giardia lamblia*) и облигатными анаэробными микроорганизмами.

Антимикотический эффект клотримазола связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что приводит к изменению проницаемости мембраны и вызывает последующий лизис клетки. В малых концентрациях клотримазол действует фунгистатически, а в больших - фунгицидно, причем не только на пролиферирующие клетки. В фунгицидных концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными ферментами, в результате чего происходит увеличение концентрации перекиси водорода до токсического уровня, что также способствует разрушению грибковых клеток.

Хлоргексидин проявляет антибактериальное действие путём неспецифического связывания с фосфолипидами клеточной мембраны бактерий, где хлоргексидин тормозит активность дегидрогеназы и АТФ-азы и нарушает проницаемость мембраны для калия, нуклеотидов и аминокислот.

Фармакокинетика

Метронидазол при интравагинальном применении абсорбируется в системный кровоток. С_{тах} в крови определяется через 6–12 ч и составляет примерно 50% от той С_{тах}, которая

достигается (через 1–3 ч) после однократного приема эквивалентной дозы метронидазола внутрь. 60–80% метронидазола и его метаболитов выводится почками, через кишечник выделяется 6–15% введенной дозы.

Клотримазол в незначительной степени всасывается из слизистых оболочек (3%). Абсорбированный препарат метаболизируется в печени и выводится почками; период полураспада составляет 3–5 часов.

Хлоргексидин практически не абсорбируется через слизистую оболочку.

Показания к применению

- бактериальный вагинит;
- грибковый кольпит;
- вагинальный трихомониаз;
- кольпит со смешанным инфекционным характером.

Способ применения и дозы

Вагинально. Непосредственно перед сном, вымыв руки, в положении лежа, поместить суппозиторий на кончик пальца и ввести глубоко внутрь влагалища (задний свод). Применять по одному суппозиторию на одно применение. Курс лечения составляет 7 дней. Повторный курс лечения необходимо провести после первого *mensis* (менструального кровотечения), с момента прекращения применения препарата.

Побочные действия

В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции, возможно чувство жжения во влагалище.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Лекарственные взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение с другими препаратами для вагинального применения.

Нистатин и натамицин снижают эффективность клотримазола.

Особые указания

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется применять беременным в первом триместре беременности. Не рекомендуется применять препарат при нарушении целостности упаковки или изменении внешнего вида свечи.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами

Не влияет.

Передозировка

Не наблюдалась.

Форма выпуска

По 5 суппозиториев упакованы в стрип. По 1 или 2 стрипа вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. Не допускать замерзания препарата.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель Регистрационного Удостоверения и Произведено для
ZDOROVIIYA MED PTE LTD, Сингапур

Производитель

«Vansh Remedies», Индия

Адрес: D-19/4 TH Floor, Taskand Society, Nizampura, Vadodara - 390 002, Индия.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по
качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ООО «SHAYANA FARM»

Республика Узбекистан, 700057, г. Ташкент, ул. Уста Ширин дом-117.

Тел.: 99(871) 2281692(93/94)

Факс: 99 (871) 2281695