



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЭРИКОН

Торговое название препарата: Эрикон

Действующее вещество (МНН): лактобациллы и бифидобактерии.

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

1 капсула содержит:

активные компоненты: Лактобациллы (*Lactobacillus acidophilus*) 220,0 мг ($2,5 \times 10^9$ спор), *Bifidobacterium longum* ($0,833 \times 10^9$ миллион спор), *Bifidobacterium bifidum* ($0,833 \times 10^9$ спор), *Bifidobacterium infantis* ($0,833 \times 10^9$ спор), Общее количество бифидобактерий (*Bifidobacteria*) 220,0 мг ($2,5 \times 10^9$ спор)

Описание: твёрдые желатиновые капсулы, состоящие из корпуса тёмно-синего цвета и крышечки голубого цвета, содержащие порошок почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Эубиотик.

Код АТХ: A07FA01.

Фармакологические свойства

Нормализует микрофлору кишечника. Поддерживает и регулирует физиологическое равновесие кишечной микрофлоры (микробиоценоз), обеспечивает ее физиологические функции в кишечнике.

Бактерии в составе Эрикон восстанавливают нарушенный баланс кишечной микрофлоры при дисбактериозе.

Живые молочнокислые лиофилизированные бактерии, входящие в его состав, являются составной частью нормальной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие микробиоценоза во всех отделах кишечника, обладают выраженными антагонистическими свойствами в отношении патогенной и условнопатогенной флоры, участвуют в синтезе витаминов В₁, В₂, В₆, В₁₂ (в природе синтезируются только микроорганизмами), РР, К и Е, фолиевой и аскорбиновой кислот, обеспечивают потребность организма в биотине, обладают иммуностимулирующими свойствами. Продуцируя молочную кислоту и снижая рН кишечного содержимого, используемые микроорганизмы создают благоприятные условия для всасывания железа, кальция, витамина D. Молочнокислые бактерии осуществляют ферментативное расщепление белков, жиров и сложных углеводов (в т.ч. при лактазной недостаточности у детей), не всосавшиеся в тонкой кишке углеводы и белки подвергаются более глубокому расщеплению в толстой кишке анаэробами. Бактерии, входящие в состав препарата, облегчают переваривание белков у грудных детей; участвуют в метаболизме желчных кислот (образовании стеркобилина, копростерина, дезоксихолевой и литохолевой кислот способствуют реабсорбции желчных кислот).

Эрикон обеспечивает поступление «лечебной» микрофлоры в количественно и качественно сбалансированных соотношениях.

Антагонистические свойства Эрикон связаны со способностью входящих в его состав микроорганизмов, продуцировать молочную и, в меньшей степени, уксусную и пропионовую кислоты. Создаваемая кислая среда (рН внутрикишечного содержимого приближается к 4,0–5,8) является неблагоприятной для развития патогенных и условнопатогенных микроорганизмов.

Показания к применению

Профилактика и лечение дисбактериоза:

- дисбактериоз и его проявления (диарея, запор, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, у грудных детей – срыгивание), диспепсия (нарушение пищеварения) у взрослых и детей, в том числе грудных;
- дисбактериоз в результате лечения противомикробными и противоопухолевыми (“химиотерапевтическими”) лекарственными средствами
- лечение транзиторных дисфункций кишечника (как диареи, так и запора), связанных с изменением пищевого рациона, поездками и другими причинами;

Способ применения и дозы

Внутрь.

Новорожденные и дети до 2 лет: по 1 капсуле в день;

Дети в возрасте от 2 до 12 лет: по 1-2 капсулы в день;

Взрослые и дети старше 12 лет: по 2-3 капсулы в день.

Эрикон следует принимать до приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.

Детям до 3-х лет и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости или пищи.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма. Средний курс составляет 2 недели. Индивидуальный курс лечения определяется врачом.

Побочные действия

Нежелательные эффекты при применении молочнокислых бактерий отмечаются крайне редко. Может иметь место аллергическая реакция.

В случае появления аллергических реакций или неописанных побочных эффектов следует прекратить прием Эрикон и как можно скорее обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата или молочным продуктам.

Лекарственные взаимодействия

Клинически существенных данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами не обнаружено.

Эрикон капсулы могут назначаться одновременно с антибиотиками и химиотерапевтическими средствами.

При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

Особые указания

Применение при беременности и лактации

Применение препарата Эрикон при беременности и в период лактации считается безопасным.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и работу с механизмами

Эрикон не снижает скорость реакции и поэтому может быть назначен водителям и лицам, работа которых требует повышенной концентрации внимания.

Другие указания

Не следует запивать Эрикон горячими напитками или применять одновременно с алкоголем.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом Эрикон, если у Вас:

- температура тела выше 38°C;
- следы крови или слизи в стуле;
- диарея длится более двух дней и сопровождается сильными болями в животе, обезвоживанием и потерей веса;
- хронические заболевания: сахарный диабет, СПИД.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Эрикон не сообщалось.

Форма выпуска:

Первичная упаковка: по 10 капсул в блистере из алюминиевой фольги и ПВХ.

Вторичная упаковка: по 1 блистеру вместе с инструкцией по медицинскому применению, вложенные в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в сухом и защищённом от света месте при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Coral Laboratories Ltd, India

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан

ООО «SHAYANA FARM» Республика Узбекистан

г. Ташкент 700057, ул. Уста Ширин, дом-117.

Тел.: 99(871) 2281692(93/94)

Факс: 99(871) 2281695