

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА ФОРОНЕКС

Название БАДа: ФОРОНЕКС

Форма БАДа: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Состав:

Каждая таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит:

активные вещества: панкреатин 300 протеолитических единиц - 120 мг, папаин 90 единиц FIP - 30 мг, рутозид (тригидрат рутина) 50 мг, бромелайн 225 единиц FIP - 45 мг, трипсин 360 единиц FIP - 10 мг, липаза 34 единиц FIP - 1 мг, амилаза 50 единиц FIP - 1 мг, химотрипсин 300 единиц FIP - 1 мг.

вспомогательные вещества: метилпарабен 1 мг, пропил парабен 0,25 мг, микрокристаллическая целлюлоза 185,55 мг, РVPK-30 12,5 мг, этилцеллюлоза 10 мг, стеарат магния 12,5 мг, порошок талька 10 мг, EC-4S 27,5 мг, краситель Сгипсон-4R 2,5 мг, краситель Yellow Orange 1 мг.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Этот продукт представляет собой научно разработанную комбинацию протеолитических ферментов и биофлавоноида (рутозида), которые действуют синергетически, поддерживая естественную реакцию организма на воспаление, способствуя восстановлению тканей, а также улучшая кровообращение и иммунитет.

Протеолитические ферменты (панкреатин, трипсин, химотрипсин, бромелайн, папаин) помогают расщеплять воспалительные белковые комплексы и фибрин в кровеносных сосудах и поврежденных тканях.

Рутозид поддерживает здоровье сосудов и действует как антиоксидант, стабилизируя капилляры и снижая окислительный стресс.

Липаза и амилаза способствуют расщеплению жиров и углеводов, поддерживая функцию пищеварения.

Показания к применению

Кишечнорастворимая оболочка обеспечивает прохождение ферментов через желудок в неизменном виде и их всасывание в тонком кишечнике для системного эффекта. Эту добавку можно использовать в качестве вспомогательной терапии для:

- Улучшения функционального состояния суставов и мышц (например, артрит, тендинит);
- Улучшения состояний мягких тканей (например, растяжениях связок, ушибах, растяжениях);
- Поддержки восстановления при послеоперационных отеках;
- Улучшения состояния при хронических воспалениях;
- Поддерживающей терапии при варикозном расширении вен, геморрое и хрупкости сосудов;
- Нормализации пищеварительных ферментов (вспомогательная роль).

Способ применения и дозы

Взрослым: 2-3 таблетки в день.

Принимать натощак (не менее чем за 45 минут до еды или через 2 часа после еды).

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая водой. Не разжевывать и не измельчать.

Дозировка может быть скорректирована диетологом в зависимости от индивидуальных потребностей.

Побочные действия

В целом переносится хорошо. Редкие побочные эффекты включают:

- ЖКТ (тошнота, метеоризм, диарея);
- Кожная сыпь или аллергические реакции;
- Раздражение полости рта или горла (редко).

Противопоказания

Известная повышенная чувствительность к любому компоненту продукта.

Острая язвенная болезнь.

Тяжелая печеночная или почечная недостаточность.

Нарушения свертываемости крови или одновременный прием антикоагулянтов (например, варфарина) — применять с осторожностью.

Беременность и лактация — только под наблюдением врача.

Взаимодействия

Может усиливать действие антикоагулянтов или антиагрегантных препаратов.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата в сочетании с НПВС или кортикостероидами.

Особые указания

Не рекомендуется детям без рекомендации врача.

Прекратите использование и обратитесь к врачу при возникновении аллергических реакций.

С осторожностью применять пациентам с аллергией на белки (например, на папайю, ананас или продукты из свинины).

Применение при беременности и в период лактации

Использовать только по рекомендации врача. Безопасность применения во время беременности и грудного вскармливания не до конца изучена.

Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

БАД к пище не является лекарственным средством.

Форма выпуска

По 20 таблеток в блистере.

По 10 блистеров в картонной упаковке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Заявитель:

Эксклюзивный дистрибьютор в Республике Узбекистан:
ООО «SHAYANA FARM»

Производитель:

Bajaj Nutraceuticals

Khasra No. 328M, Muza Raipur Industrial Area,
Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar,
Uttarakhand, 247661, Индия.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО «SHAYANA FARM»

Республика Узбекистан, 100098, г. Ташкент, Анжиянский район, Кара-Камыш 1/4, ул. Гульсарай, д. 19

Тел.: +998 71 207 2191, 92, 93, 95, 96; Факс: +998 71 207 2194;

Моб.: +998 90 830 7287

E-mail: pharmacovigilance@shayanafarm.com

Web-сайт: shayanafarm.com

