

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ КЮПЕН QUPEN

Торговое название препарата: Кюпен

Действующие вещества (МНН): парацетамол, диклофенак натрия

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

Каждая таблетка содержит:

активные вещества: парацетамол 500 мг, диклофенак натрия 50 мг;

вспомогательные вещества: крахмал, желатин, тальк очищенный, магния стеарат, натрия крахмал гликолят, краситель Sunset Yellow FCF, безводная коллоидная двуокись кремния, вода очищенная (достаточное количество).

Описание: круглые двояковыпуклые двухслойные таблетки, состоящие из двух цветных слоев: от белого до почти белого с одной стороны и от светло-оранжевого до темно-оранжевого с белыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа: анальгетик-антипиретик

Код АТХ: N02BE51

Фармакологические свойства

Таблетки Кюпен содержат 2 вещества из группы НПВС – парацетамол и диклофенак натрия. Оба средства подавляют активность циклооксигеназы, способствующей образованию циклических эндопероксидов из арахидоновой кислоты. Циклические эндопероксиды служат исходным материалом в процессе образования простагландинов, участвующих в развитии воспаления и его клинических проявлений – боли, отека, повышения температуры.

Диклофенак подавляет образование простагландинов за счет угнетения активности обеих разновидностей циклооксигеназы. Тем самым оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие. Жаропонижающий эффект выражен умеренно. Центральный механизм обезболивающего действия диклофенака связан с ингибированием образования простагландинов в нервной системе.

Парацетамол оказывает преимущественно центральное действие, угнетая образование простагландинов в нервной системе. Является сильным анальгетиком и антипиретиком. Противовоспалительный эффект выражен слабо.

Фармакокинетика

Диклофенак хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Скорость абсорбции немного замедляется при одновременном приеме пищи. Способен проникать в синовиальную жидкость. Метаболизм осуществляется преимущественно в печени. Часть метаболитов фармакологически активна. Экскреция метаболитов осуществляется в основном почками, частично – с желчью. Около 1% диклофенака экскретируется почками в неизмененном виде.

Всасывание парацетамола в пищеварительном тракте происходит быстро, преимущественно в тонком кишечнике. Метаболизм парацетамола происходит в печени. Продукты обмена экскретируются почками. В неизмененном виде почки экскретируют 5% препарата.

Показания к применению

Рекомендуется для симптоматического лечения простудных заболеваний, головной боли, невралгии, зубной боли, люмбаго, остеоартроза, ишиаса, ревматоидного артрита,

радикулита, лихорадочных состояний, бурситов, тендинитов, миозитов, дисменореи, послеоперационной боли.

Способ применения и дозы

Для перорального использования.

Не применять у детей младше 12 лет.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке 2 – 3 раза в день после еды.

Или как предписано врачом.

Побочные действия

- Анорексия, запор, тошнота, абдоминальные боли, диарея;
- язвы пищеварительного тракта с возможным осложнением кровотечением (как правило, встречаются только при длительном использовании);
- депрессия, сонливость, головная боль;
- гематурия, нефротический синдром, острая почечная недостаточность, протеинурия;
- тромбоцитопения, анемия;
- аллергические реакции.

Симптомы побочных эффектов (если таковые имеются) должны спадать после отмены лекарства. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Противопоказания

Противопоказан при

- обострении язвенной болезни;
- беременности;
- заболеваниях почек;
- в период лактации;
- «аспириновой триаде» (сочетание полипоза носа и придаточных пазух, непереносимости НПВС и бронхиальной астмы);
- детский возраст до 12 лет..

Лекарственные взаимодействия

Кюпен снижает клинические эффекты фуросемида и гипотензивных препаратов, потенцирует эффект калийсберегающих диуретиков. Повышает содержание дигоксина в плазме. Одновременное назначение кортикостероидов повышает риск развития язв пищеварительного тракта. Повышает токсические эффекты метотрексата. Усиливает нефротоксический эффект циклоспорина. Возможно потенцирование действия антикоагулянтов.

Особые указания

Необходимо соблюдать осторожность при использовании препарата у пациентов с нарушениями функций почек и печени. Проверьте срок годности на упаковке и не используйте препарат после истечения срока годности.

Беременность и лактация

Не следует использовать в период беременности или лактации. Применять при беременности только если потенциальная польза для пациента перевешивает потенциальный риск для плода.

Передозировка

Симптомы: почечная недостаточность, артериальная гипотензия, судороги, диспептические явления, нарушения дыхания.

Лечение – симптоматическое.

Форма выпуска

10 таблеток в контурно-ячейковой упаковке, 10 контурно-ячейковых упаковок в картонной коробке с инструкций по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить в сухом, темном месте, при температуре не выше 25°C.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Производитель:

SSM Formulations Private Limited, India

Произведено для Avison Pharmaceutical Pvt. Ltd., India

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:

ООО "SHAYANA FARM"

Республика Узбекистан, г. Ташкент 700057, ул. Уста Ширин дом-117,

Тел.: 99(871) 2281692(93/94)

Факс: 99 (871) 2281695